

Tôi sẽ giúp bạn giảm đường máu sau ăn

Written by Administrator

Wednesday, 07 December 2011 16:52 -


Đái tháo đường là một bệnh không lây nhiễm nhưng lại gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Biến chứng của bệnh là mức đường trong máu luôn luôn cao. Acarbose tôi sẽ là một trong những công cụ giúp các bệnh nhân kiểm soát lượng đường trong máu. Bí quyết của tôi là enzyme men alpha-glucosidase ruột, đặc biệt là sucrase, làm chậm tiêu hoá và hấp thu carbohydrate, làm cho đường máu tăng chậm hơn sau khi ăn.

Tôi sẽ hỗ trợ đặc biệt với các trường hợp đái tháo đường typ 2 (không phụ thuộc insulin), đặc biệt những người tăng đường máu sau ăn mà không kiểm soát được bằng chế độ ăn và tập luyện hoặc có thể phối hợp với nhóm sulfonylurê như một thuốc phụ trợ chế độ ăn và tập luyện để điểu trị đái tháo đường typ 2. Những bệnh tăng glucose máu không kiểm soát được khi dùng sulfonylurê cần đặc. Khác với các anh em dùng đái tháo đường nhóm sulfonylurê, tôi không làm tăng tiết insulin, cũng không gây giảm đường máu lúc đói khi dùng đơn trị liệu. Tôi chỉ yêu cầu làm chậm hơn là ngăn cản hấp thu glucose nên không làm mất nhiều calo trong lâm sàng và không gây sụt cân ở người bình thường và người đái tháo đường. Tôi cũng có thể kết hợp để giúp cải thiện kiểm soát glucose máu ở bệnh nhân ít kết quả bằng các liệu pháp thông thường.

Tôi sẽ giúp bạn giảm đường máu sau ăn

Written by Administrator

Wednesday, 07 December 2011 16:52 -



Acarbose kiểm soát lượng đường trong máu.

Các bệnh cần uống tôi vào đầu bữa ăn để giảm nồng độ glucose máu sau ăn. Liều phải do thầy thuốc điều chỉnh cho phù hợp từng trường hợp cụ thể, vì hiệu quả và dung nạp tôi thay đổi tùy từng người bệnh. Phải nhai tôi cùng với miếng ăn đầu tiên hoặc nuốt viên cùng với ít nước ngay trước khi ăn.

Khi dùng tôi, phải lưu ý các bệnh thường gặp các triệu chứng: đầy bụng, phân nát, tiêu chảy, buồn nôn, bệnh trĩ và đau... Tác dụng không mong muốn có thể giảm khi vận tiệp thức đi vào ruột. Để giảm thiểu các tác dụng phụ và tiêu hoá, nên bắt đầu đi vào thói quen liều thấp nhất và tăng dần cho tới khi đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên không dùng thuốc chẹn acid để đi vào ruột các tác dụng phụ và tiêu hoá này nhé.

Tôi sẽ giúp bạn giảm đau đầu sau ăn

Written by Administrator

Wednesday, 07 December 2011 16:52 -

H. Đau đầu

[website](#) [Ads by NhutCorp](#) [Máy tính](#) [Hệ thống điện](#) [Doanh nghiệp](#) [Thị trường](#)